


Miracletox Miracletox Light

Pleťová



Tělová péče

Angelto Cream



OBSAH

Co je MIRACLETOX LIGHT?

- MIRACLETOX LIGHT – Název
- Co je atopická dermatitida?

MIRACLETOX LIGHT ANGELTO CREAM

- Koncept, Patentované složení
- Hlavní složky
- Vedlejší složky
- Výrobky
- Účinky
- Opatření


MIRACLETOX

— L I G H T —

- MIRACLETOX LIGHT, rozjasnění pleti
- MIRACLETOX LIGHT, snadno dostupný

Co je atopická dermatitida?

Prevalence atopické dermatitidy (od roku 2013)



Atopická dermatitida je chronickým zánětem kůže, který se projevuje svěděním, suchostí a výskytem ekzematických lézí. Nejčastěji se začíná projevovat u novorozenců nebo dětí.


U jednotlivců se liší stupeň závažnosti, ale nejčastějším příznakem je svědění. Jde o reakci na vnější stimulaci velmi citlivé pokožky.

Přesná příčina dlouhodobého onemocnění pokožky není známá. Nicméně častými faktory bývají dědičnost, vliv vnějšího prostředí a také jde o souvislost s nedostatečnou imunitou. Takové onemocnění pokožky vyvolává mnoho příčin včetně suché pokožky, kůže se sklonek ke svědění, bakteriální / virové / plísňové infekce a emocionálních/environmentálních faktorů.


Svědění nutí pacienty škrábat se. Jenže škrábání zanechává krváčení a jizvy. Pacienti pak kvůli poraněním a jizvám nechtějí ukazovat své tělo ve veřejných lázeňských zařízeních, plaveckých bazénech a na dalších podobných místech. Odstraňování mrtvých buněk poškozené a tenké pokožky je velmi bolestivé.

Obecně pokožka opuchne a objeví se vyrážka. V závažných případech dochází ke krváčení. Na tenké pokožce, například na obličeji, se vyskytuje vyrážka nebo šupinky z mrtvých kožních buněk. V posledním stadiu vytéká z ranek tekutina a na pokožce se objevují mokravé skvrny.


Věková kategorie / Postižené oblasti a charakteristika




Příčiny atopické dermatitidy



Struktura atopické pokožky



Rohová vrstva (stratum corneum), tedy zevní vrstva epidermis chrání pokožku před ztrátou hydratace.




Zastavuje vnější agresory a funguje jako bariéra pokožky.




Když se vrstva lipidů mezi mrtvými kožními buňkami zesiluje, je také bariéra mnohem účinnější.




Lipidy tvoří cholesterol, ceramidy a volné mastné kyseliny.




Pokud klesne hladina takových látek (cholesterolu, ceramidů, volných mastných kyselin atd.), oslabí se i vrstva lipidů.



Pokožka se začne vysušovat a ztrácet hydrataci.



Pak mohou prostupovat vnější agresivní látky a způsobovat alergie.



Pokožka se vysuší, poškodí se kožní bariéra a vzniká zanícená rána.

Struktura atopické pokožky

1. Dědičné účinky

Genetika je hlavní příčinou vzniku atopické dermatitidy. U jednovaječných dvojčat je z hlediska pravděpodobnosti vyšší výskyt atopické dermatitidy než u dvouvaječných dvojčat. Při srovnávání případů, kdy trpí pouze jeden rodič kožním onemocněním, nebo jsou oba rodiče atopickými pacienty, je mnohem vyšší pravděpodobnost, že jejich potomek bude trpět atopickou dermatitidou. Jinými slovy rozvoj atopické dermatitidy úzce souvisí s dědičnými faktory. Pokud rodič nebo sourozenec trpí (nebo dříve trpěl) atopickou dermatitidou, je proto nutné již předem pečlivě sledovat a správně pečovat o kožní projevy.

2. Změny v imunitní regulaci

U atopické dermatitidy, stejně jako u jiných alergií, je v krevním séru výrazně vysoká koncentrace imunoglobulinu E, který hraje nejdůležitější roli při rozvoji alergických reakcí. Z takových důvodů existuje u dítěte, které trpělo atopickou dermatitidou, vysoké riziko vzniku dalších alergických onemocnění jako astma nebo alergická rýma.

Atopická dermatitida se v jediném ohledu liší od ostatních alergických onemocnění. Příznaky takového onemocnění kůže začínají již před stým dnem od narození. Pokud se příznaky správně zvládnou, většinou zmizí kolem druhého roku věku. Na rozdíl od ostatních alergických onemocnění, při kterých příznaky přetrvávají.

3. Změny vnějšího prostředí

Strava

Odborníci se domnívají, že se atopická dermatitida objevuje častěji kvůli upřednostňování umělé výživy před kojením a naprosto odlišným složením dětské stravy během posledních 20 až 30 let.

Z výzkumu centra Environmental Health Center for Atopic Diseases vyplývá, že nejzásadnějším spouštěčem atopické dermatitidy jsou vejce, pak mléko a sójové mléko (boby). Pravdou zůstává, že kojení atopické kožní projevy zmírňuje, ale příznaky se mohou u dítěte zhoršovat, pokud matka zařazuje do stravy vejce, proto je třeba dbát i na stravu matky.

V minulosti se přidávala vejce do umělé výživy, protože se považovala za zdravý zdroj železa. Také dříve populární potravina seonsik (prášek různých opražených obilovin a zeleniny) obsahuje různé složky, jako jsou ořechy a boby, které by mohly způsobovat atopickou dermatitidu. Tudíž je nutné pečlivě zvážit používání takových potravin v dětské výživě. Kožní onemocnění mohou zhoršovat také některé přídatné látky.

4. Změny v domácím prostředí

Domácí roztoči jsou nejčastějším zdrojem alergenních látek. Moč, výkaly a tělní kapaliny z odumřelých buněk stimulují imunitní buňky a snadněji způsobují alergickou reakci. Roztoči se živí odumřelými kožními buňkami, způsobují svědění a zhoršují příznaky. Také platí, že povlečení nebo lůžkoviny vytvářející statickou elektřinu, chemické složky z deodorantů a chemické složení látek způsobují atopickou dermatitidu.

5. Kožní infekce

Pacienti s atopickou dermatitidou jsou mnohem náchylnější k bakteriálním, plísňovým nebo virovým infekcím, které atopické příznaky zhoršují. Trpí tedy dermatitidou mnohem častěji. Nedávno se objevila souvislost se superantigeny, zejména stafylokoky, kteří žijí na povrchu kůže.


Angelto Cream



Beauren Korea's M&G Patent
Č. patentu: 10-2095265

Angelto Cream

Angelto Cream




Hydratační štít

MGW OLEJ

Ochranná bariéra

Miracletox Light

HLAVNÍ KONCEPT: POTE MNÍKOVÝ A KOBYLKOVÝ OLEJ



POTE MNÍKOVÝ A KOBYLKOVÝ OLEJ

V zemích, jako je Čína, Kanada a Nizozemsko, již potemníky jedli dříve. V Korejské republice byli uvedeni jako potravinová složka v červenci 2014.

Potemníkové a kobyolkové oleje jsou bohaté na bílkoviny, nenasycené mastné kyseliny, vitaminy B3 a B5 a esenciální aminokyseliny. Také zmírňují atopické příznaky.

Bílkoviny v potemníkovém oleji jsou z hlediska složení totožné s mléčnými bílkovinami.

Obsah všech devíti esenciálních aminokyselin vyskytujících se v mléce pomáhá udržet hydrataci v pokožce, pečovat o odumřelé kožní buňky a omlazovat pokožku tím, že dochází k tvorbě hydratační bariéry. Fungují také při ochraně a výživě pokožky a udržují ji pevnou a pružnou.

POTEMNÍKOVÝ A KOBYLKOVÝ OLEJ



Čistota hory Jirisan

Jedlý hmyz s vysokým obsahem bílkovin



Bezpečná jedlá strava
(Strava budoucnosti)

Obiloviny a zelenina bez
pesticidů

(Farmářské pěstitelství: Fermentovaný
enzym z rostliny Maclura účinně
zmírňuje atopickou dermatitidu)

Přísné výrobní procesy

100% korejský

HLAVNÍ KONCEPT



47 % vody z cypřišku tupolistého
(Hydratace, ochrana pokožky, zmírnění svědění)

VEDLEJŠÍ KONCEPT: POTEVNÍKOVÝ A KOBYLKOVÝ OLEJ

Přirozený zdroj



Lactobacilus / Ženšen pravý
Filtrát z fermentovaného kořene



Lactobacilus / Sójový bob
Fermentovaný výtažek



Saccharomyces / Slzovka obecná
Ma-yuen Filtrát z fermentovaných semen



Lactobacilus / Fermentovaná rýže



Saccharomyces / Filtrát z fermentovaného výtažku z brambor

(Skvělé hydratační a rozjasňující účinky)

ČTYŘI VÝTAŽKY Z MOŘSKÝCH ŘAS



Výtažek z řasy Wakame



Výtažek z řasy Porphyra Tenera



Výtažek z řasy kombu



Výtažek z řasy Enteromorpha Compressa

(Zmírňuje svědění způsobené zahříváním)



MIRACLETOX LIGHT ANGELTO CREAM

[Pleťová a tělová péče (Používá se ráno a večer)]

Potemníkový a kobyolkový olej a čtyři výtažky z mořských řas s výjimečnými hydratačními vlastnostmi vytvářejí na suché (svědivé) pokožce hydratační film, který ulevuje od svědění. Tento krém pomáhá pokožku zklidnit a zjemnit.

Co je „zdravá pokožka“?

Lehce kyselá hladina pH (5,0–6,0) s dostatečnou hydratací a ochrannou bariérou



Pokožka s lehce kyselým pH dokáže přijmout novou hydrataci a výživu

SLOŽENÍ



EWG GREEN

EWG GREEN



MALÉ RIZIKO



STŘEDNÍ RIZIKO



VYSOKÉ RIZIKO



Hydratační účinek s příměsí nattó
Jemný, šetrný a vysoce koncentrovaný hydratační
krém bez lepivého efektu


Miracletox Light

Doporučeno pro:

- jedince s poškozenou rohovou vrstvou
- jedince, kteří potřebují zklidnit pokožku podrážděnou vnějšími faktory
- jedince, kteří potřebují ulevit od svědění v důsledku suché pokožky
- jedince, kteří chtějí zdokonalit ochrannou bariéru pokožky
- jedince, kterým se suchá pokožka nehydratuje prostřednictvím běžně dostupných přípravků
- jedince vyhledávající šetrnou a vysoce hydratační péči
- jedince vyhýbající se umělým barvivům a konzervantům
- jedince se suchou a citlivou pokožkou


„Úleva od svědění v důsledku suchosti pokožky“

Analýza transdermální ztráty hydratace



Ve srovnání se stavem před aplikací se množství transdermální ztráty hydratace značně snížilo (stav se tedy zlepšil) o 20 % po dvou týdnech používání přípravku.


Výsledek analýzy podílu vlhkosti v pokožce



Ve srovnání se stavem před aplikací se podíl vlhkosti v pokožce značně zvýšil (zdokonalil) o 67 % po dvou týdnech používání přípravku.

„Úleva od svědění v důsledku suchosti pokožky“

Výsledek vlastního hodnocení úlevy od svědění v důsledku suchosti pokožky



Ve srovnání se stavem před aplikací se **míra svědění způsobená suchostí pokožky značně snížila (stav se zlepšil) o 61,46 %** po dvou týdnech používání přípravku.

„Úleva od svědění v důsledku suchosti pokožky“

Výsledky hodnoticího šetření příznaků svědění

Položka	Počet	Podíl odpovědí
Svědí více	0	0,00
Bez rozdílu	0	0,00
Trochu lepší, ale stále svědí	2	9,52
Mnohem lepší, ale stále svědí	6	28,57
Žádné svědění	13	61,90

Po dvou týdnech používání přípravku odpovědělo 62 % respondentů, že již nepocítují žádné příznaky svědění.

„Úleva od svědění v důsledku suchosti pokožky“

Vliv příznaků svědění na spánek

Položka	Před aplikací		2 týdny používání	
	Počet	Podíl odpovědí	Počet	Podíl odpovědí
Svědí více	2	9,52	0	0,00
Bez rozdílu	6	28,57	0	0,00
Trochu lepší, ale stále svědí	10	47,62	2	9,52
Mnohem lepší, ale stále svědí	2	9,52	2	9,52
Žádné svědění	1	4,76	17	80,95

Počet respondentů, kteří odpověděli, že příznaky svědění mají vliv na spánek, se snížil z 95 % na podíl 19 % po dvou týdnech používání přípravku.

„Úleva od svědění v důsledku suchosti pokožky“


Vliv příznaků svědění na každodenní život

Položka	Před aplikací		2 týdny používání	
	Počet	Podíl odpovědí	Počet	Podíl odpovědí
Vždy ovlivňuje	2	9,52	0	0,00
Často ovlivňuje	9	42,86	0	0,00
Někdy ovlivňuje	9	42,86	1	4,76
Zřídka ovlivňuje	1	4,76	9	42,86
Žádný vliv	0	0,00	11	52,38

Ve srovnání se stavem před používáním se počet respondentů, kteří odpověděli, že se po dvou týdnech používání přípravku příznaky svědění ovlivňující jejich každodenní život snížil ze 100 % přibližně na 48 %.

„Úleva od svědění v důsledku suchosti pokožky“


Výsledky výzkumu hodnocení účinků



Mezi 95 % – 100 % respondentů odpovědělo kladně na všechny otázky po dvou týdnech používání přípravku.

„Úleva od svědění v důsledku suchosti pokožky“

Výsledky výzkumu hodnocení používání přípravku



Mezi 95 % – 100 % respondentů odpovědělo kladně na všechny otázky po dvou týdnech používání přípravku.



Opatření!

1. Nedoporučuje se jedincům, kteří trpí alergií na korýše
2. Složení nattó; rozšiřitelné!
Skvělá hydratace a vyšší účinnost

Děkuji

82-2-6959-5440

HQ: 2F, 146, Bongeunsa-ro, Gangnam-gu, Soul, Korejská republika

ZÁVOD: 75B 1L, 210, Namdongdong-ro, Namdong-gu, Incheon, Korejská republika